

ຄຳແນະນຳສຳລັບການເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີສຳລັບ TB

ເປັນຫຍັງການກວດຂີ້ກະເທີຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ?

ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຕ້ອງການເກັບຕົວຢ່າງຂອງຂີ້ກະເທີ (“ມູກ”) ທີ່ທ່ານໄອອອກມາຈາກປອດຂອງທ່ານ. ຫ້ອງວິເຄາະຈະເອົາຂີ້ກະເທີໄປກວດເພື່ອຊອກຫາເຊື້ອວັນນະໂລກ (TB) . ກວດຫາເຊື້ອທາງຂີ້ກະເທີແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຄົ້ນຫາວ່າທ່ານມີເຊື້ອພະຍາດ TB ຫຼືບໍ່. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາສຳລັບພະຍາດ TB ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຜ່ານຂີ້ກະເທີແມ່ນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າຢາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ຜົນກັບທ່ານຫຼືບໍ່. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການກວດແມ່ນຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ, ທ່ານຕ້ອງໄອເອົາຂີ້ກະເທີອອກມາຈາກ ປອດໃຫ້ໄດ້ເລິກທີ່ສຸດ. ຂີ້ກະເທີທີ່ມາຈາກປອດຂອງທ່ານຈະຂ້ອນຂ້າງຊັນ ແລະ ໜຽວ. ນ້ຳລາຍທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງທ່ານຈະເປັນ ນ້ຳ ແລະ ໃສ. ບໍ່ເອົານ້ຳລາຍ.

ວິທີການ: ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໄອເອົາຂີ້ກະເທີອອກໄດ້, ໃຫ້ພະຍາຍາມສູດດົມເອົາອາຍຈາກນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື ໝໍ້ດົມນ້ຳຮ້ອນ.

ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີ

ທ່ານໝໍ ແລະ ພະຍາບານຈະເອົາຈອກຢາງພິເສດໃຫ້ທ່ານເພື່ອເກັບເອົາຂີ້ກະເທີຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ດີ:

1. ຈອກຕ້ອງສະອາດດີທີ່ສຸດ. ຢ່າເປີດມັນຈົນກວ່າທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຊ້ມັນ.
2. ໃນທັນທີທີ່ທ່ານຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ (ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກິນ ຫຼື ດື່ມ), ຖູແຂ້ວ ແລະ ລ້າງປາກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ. ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳຢາມ້ວນປາກ.
3. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ອອກໄປຂ້າງນອກ ຫຼື ເປີດປ່ອງຢ້ຽມກ່ອນຈະເກັບຕົວຢ່າງຂອງຂີ້ກະເທີ. ນີ້ເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນອື່ນຈາກເຊື້ອ TB ໃນເວລາທ່ານໄອ.
4. ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລະ ກັ້ນຫາຍໃຈເປັນເວລາ 5 ວິນາທີ. ປ່ອຍລົມຫາຍໃຈອອກຊ້າໆ. ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອີກເລິກໆ ແລະ ໄອແຮງໆຈົນກວ່າຂີ້ກະເທີຈະອອກມາໃສ່ປາກ.
5. ຖິ້ມຂີ້ກະເທີໃສ່ຈອກຢາງກຽມໄວ້.
6. ປະຕິບັດແບບນັ້ນຈົນກວ່າຈະໄດ້ຂີ້ກະເທີ 5 ມລ (ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ໃນຈອກ. ຂີ້ກະເທີຈະໄດ້ປະມານ 1 ບ່ວງຊາ.
7. ປິດປາກຈອກໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນໄຫຼອອກມາ.
8. ຊຽນວັນທີ່ທ່ານເກັບຕົວຢ່າງຂີ້ກະເທີໃສ່ຈອກ.
9. ເອົາຈອກຢາງໃສ່ໃນກ່ອງ ຫຼື ຖົງທີ່ພະຍາບານໃຫ້ກັບທ່ານ.
10. ເອົາຈອກເກັບຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບຄຣິນິກ ຫຼື ພະຍາບານຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ເອົາຈອກຕົວຢ່າງແຊ່ຕູ້ເປັນຂ້າມຄືນໄດ້ຖ້າຈຳເປັນ. ຢ່າເອົາມັນແຊ່ແຂງ ຫຼື ປະໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸຫະພູມປົກກະຕິ.

Minnesota Department of Health
Tuberculosis Prevention and Control Program
651-201-5414
www.health.state.mn.us/tb

09/22/21 (Lao) ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຮູບແບບອື່ນ, ໂທຫາ: 651-201-5414.