

Trẻ em lớn và thanh thiếu niên cũng cần chủng ngừa!

Lịch trình chủng ngừa đề nghị cho trẻ em từ 7–18 tuổi

Quý vị muốn tìm hiểu thêm?
Quét mã QR này để biết con em quý vị có thể cần loại thuốc chủng ngừa nào. Hoặc vào trang mạng
www2.cdc.gov/vaccines/childquiz/



THUỐC CHỦNG NGỪA ĐỀ NGHỊ	7 TUỔI	8 TUỔI	9 TUỔI	10 TUỔI	11 TUỔI	12 TUỔI	13 TUỔI	14 TUỔI	15 TUỔI	16 TUỔI	17 TUỔI	18 TUỔI
HPV			[Solid purple bar]		[Solid purple bar]							
Tdap					[Solid purple bar]							
Viêm màng não ACWY					[Solid purple bar]					[Solid purple bar]		
Viêm màng não B										[Hatched purple bar]		
Cúm	[Solid purple bar: Hàng năm Hai liều cho một số trẻ em]		[Solid purple bar: Hàng năm]									
COVID-19	[Solid purple bar: Ít nhất 1 liều thuốc chủng ngừa COVID-19 cập nhật]											
Mpox												[Light purple bar]
Sốt xuất huyết			[Light purple bar: CHỈ ÁP DỤNG nếu sống ở nơi thường có bệnh sốt xuất huyết VÀ có kết quả xét nghiệm xác nhận đã từng nhiễm sốt xuất huyết]									

LƯU Ý

- TẤT CẢ trẻ em trong nhóm tuổi nên được chích thuốc chủng ngừa này
- MỘT SỐ trẻ em trong nhóm tuổi nên được chích thuốc chủng ngừa này
- TẤT CẢ trẻ em trong nhóm tuổi có thể chích thuốc chủng ngừa này
- Cha mẹ/người chăm sóc nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quyết định xem loại thuốc chủng ngừa này có phù hợp với con em mình hay không

Nói chuyện với bác sĩ của con em quý vị để được hướng dẫn thêm nếu:

- Con em quý vị có bệnh trạng nào khiến em có nguy cơ bị nhiễm trùng cao hơn hoặc đang mang thai.
- Con em quý vị đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ.
- Con em quý vị lỡ không được chích loại thuốc chủng ngừa được đề nghị nào cho độ tuổi của em hoặc cho em bé và trẻ nhỏ.

Những loại thuốc chủng ngừa này phòng ngừa bệnh gì?

7-18 TUỔI

BỆNH CÓ THỂ PHÒNG NGỪA ĐƯỢC BẰNG THUỐC CHỦNG NGỪA	BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH	SỐ LIỀU THUỐC CHỦNG NGỪA
HPV (Siêu vi gây u nhú ở người) Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm, lây qua sự tiếp xúc da kề da, kể cả khi quan hệ tình dục	Mụn cóc vùng sinh dục và nhiều loại ung thư sau này trong đời, bao gồm ung thư cổ tử cung, âm đạo, dương vật, hậu môn và cổ họng	2 hoặc 3 liều
Uốn ván (Cứng hàm)* Nhiễm trùng do các bào tử vi khuẩn ở trong đất và bụi khắp nơi; bào tử xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hoặc da bị trầy xước	Cơ giật, gãy xương, khó thở, tử vong	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích 1 liều cho vết thương bẩn
Bệnh bạch hầu* Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở mũi, họng và đôi khi là phổi; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Sưng cơ tim, suy tim, hôn mê, tê liệt, tử vong	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích
Ho gà* Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở phổi và đường thở; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), tử vong; đặc biệt nguy hiểm cho em bé	1 liều vào năm 11-12 tuổi Chích thêm liều nếu lúc thơ ấu không được chích 1 liều mỗi lần mang thai
Viêm màng não** Tình trạng nhiễm vi khuẩn truyền nhiễm ở màng não và tủy sống hoặc máu; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Mất cánh tay hoặc chân, điếc, cơ giật, tử vong	2 liều Có thể cần thêm liều tùy thuộc vào bệnh trạng hoặc loại thuốc chủng ngừa sử dụng.
Cúm (Bệnh cúm) Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng và đôi khi là phổi; lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm trùng xoang và tai, các bệnh về tim hoặc phổi tiềm ẩn trầm trọng hơn, tử vong	1 liều mỗi năm 2 liều ở một số trẻ từ 6 tháng tuổi đến 8 tuổi
COVID-19 Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm ở mũi, họng hoặc phổi; có thể cảm thấy như bị cảm lạnh hoặc cúm. Lây qua không khí và tiếp xúc trực tiếp	Nhiễm trùng phổi (viêm phổi); cục máu đông; tổn thương gan, tim hoặc thận; Covid kéo dài; tử vong	1 hoặc nhiều liều thuốc chủng ngừa giữa giữa COVID-19 cập nhật 2023-2024 tùy theo tình trạng sức khỏe. Để biết thêm thông tin: www.cdc.gov/covidschedule
Mpox Tình trạng nhiễm siêu vi truyền nhiễm lây qua tiếp xúc gần gũi, thường xuyên giữa da kề da, bao gồm cả quan hệ tình dục; gây nổi sảy đau đớn, sốt, nhức đầu, mệt mỏi, ho, sổ mũi, đau họng, sưng hạch	Các vết loét nhiễm trùng, sưng não, nhiễm trùng phổi (viêm phổi), nhiễm trùng mắt, mù lòa, tử vong	2 liều
Bệnh sốt xuất huyết Tình trạng nhiễm siêu vi lây qua vết cắn của muỗi bị nhiễm bệnh; gây sốt, nhức đầu, đau sau mắt, nổi sảy, đau khớp, đau nhức cơ thể, buồn nôn, chán ăn, cảm thấy mệt mỏi, đau bụng	Chảy máu nghiêm trọng, cơ giật, sốc, tổn thương gan, tim và phổi, tử vong	3 liều

*Tdap phòng ngừa bệnh uốn ván, bạch hầu và ho gà

****Thiếu niên khỏe mạnh:** Thuốc chủng ngừa viêm màng não ACWY (2 liều); Thuốc chủng ngừa viêm màng não B (2 liều nếu cần).